

# انتظار برای تزریق دوز دوم واکسین کرونا برای اطفال ۱۲ الی ۱۵ ساله

به نوجوانان ۱۲ الی ۱۵ ساله از آغاز ماه سپتامبر پیشنهاد دریافت واکسین کرونا شده است. انستیتوت صحت عامه (FHI) تطبیق دوز دوم واکسین کرونا را به این گروه ارزیابی نموده است و توصیه می کند که در این مورد منتظر معلومات و تجارب بیشتر باشیم. انستیتوت صحت عامه ارزیابی جدید را در آغاز سال ۲۰۲۲ انجام خواهد داد.

به اساس ارزیابی های انستیتوت صحت عامه، هیچ دلیلی برای ارائه دوز دوم واکسین کرونا برای نوجوانان متولد سال های ۲۰۰۶-۲۰۰۹ وجود ندارد. دلیل آن این است که خطر مبتلا شدن جوانان به بیماری جدی کووید-۱۹ کم است. بعد از تزریق دوز اول واکسین، محافظت در مقابل بیماری جدی، ۸۵ در صد بوده و شخص واکسین شده الی ۱۶ هفته مصون می باشد. چون خطر مبتلا شدن جوانان متولد سال های ۲۰۰۶-۲۰۰۹ نسبت به جوانان بزرگتر کمتر است، دلایل قوی وجود ندارد که تزریق دوز دوم واکسین به این گروه، گسترش شیوع ویروس را محدود سازد.

علاوه بر این، تزریق دوز دوم واکسین کرونا می تواند باعث خطر التهاب پرده دور قلب و التهاب عضله قلب گردد، به خصوص در مردان جوان و جوانان. مطالعات و تحقیقات در کشور های اروپای شمالی معلومات بیشتر را در مورد این خطر ارائه خواهد نمود.

انستیتوت صحت عامه در آغاز سال ۲۰۲۲ معلومات بیشتر را به اساس ارزیابی های جدید در مورد عوارض جدی جانبی، گسترش بیماری و وضعیت کلی قبل از توصیه تزریق دوز دوم واکسین به این گروه سنی ارائه خواهد نمود. ۷۰ فیصد اطفال ۱۲-۱۵ ساله دوز اول واکسین را دریافت نموده اند. اطفال ۱۲-۱۵ ساله در حدود ۲۶۰۰۰۰ نفر یا ۸، ۴ در صد از جمعیت ناروی را تشکیل می دهد. سه گروه (متولدین سال های ۲۰۰۶، ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸) متعلمین مکاتب متوسطه می باشند و گروه دیگر (متولدین سال ۲۰۰۹) متعلمین مکاتب ابتدائیه می باشند.