

تقديم لقاح الكورونا للفئة العمرية 16 و 17 عامًا

قررت الحكومة تقديم لقاح الكورونا لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عامًا بناءً على توصية المعهد الوطني للصحة العامة.

يوصي المعهد الوطني للصحة العامة بتقديم لقاح الكورونا لمواليد عامي 2004 و 2005. قررت الحكومة العمل بهذه التوصية، وستدرج هذه الفئة العمرية في البرنامج الوطني للتطعيم ضد فيروس الكورونا.

- قال وزير الصحة وخدمات الرعاية بنت هوي "يعتبر الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عامًا أقل عرضة للإصابة بمرض خطير جراء كوفيد-19، ولكن مع التطورات التي شهدناها خلال فترة الصيف حيث ارتفعت العدوى بين المراهقين والشباب، فقد تزداد أعداد الشباب المعرضين لخطر الإصابة بمرض خطير. سيوفر اللقاح حماية للأفراد، ويمنح الشباب حياة يومية شبه طبيعية، ويساهم في تعزيز مناعة السكان. يمكن أن يساهم تطعيم هذه الفئة العمرية أيضًا في تقليل ضغط العدوى في المجتمع، وبالتالي تقليل الإصابة بين الأطفال الأصغر سنًا".

قام المعهد الوطني للصحة العامة وفقاً لما جاء في تقريره بشأن المهمة الموكلة إليه من قبل الحكومة، بإعطاء توصية أولية بتقديم اللقاحات لهذه الفئة العمرية. أراد المعهد إجراء تقييم جديد في وقت لاحق باستخدام أحدث المعارف والبيانات عن تطعيم المراهقين. تُعزز المعارف الجديدة التي ظهرت في الأسابيع الستة الماضية التوصية بتقديم اللقاحات لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عامًا.

البدء في تطعيم هذه الفئة بعد الانتهاء من جميع الفئات فوق سن 18 عامًا

سيتم تقديم اللقاح لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عامًا بعد أن يتم تطعيم السكان الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا بشكل كامل. ورغم ذلك فإن المجال مفتوح للبلديات في حالات خاصة لإعطاء اللقاح لبعض الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عامًا قبل بدء حملة التطعيم لهذه الفئة، على سبيل المثال الشباب الذين سيدرسون خارج البلاد ومعرضون أكثر للإصابة بالعدوى.

سيتم التطعيم في مراكز التطعيم في البلديات، كما هو الحال بالنسبة لبقية السكان وذلك بسبب الخدمات اللوجستية المعقدة ولتجنب أن يقتصر عمل الخدمات الصحية المدرسية على عملية التطعيم فقط. تتماشى هذه الاستراتيجية مع توصية المعهد الوطني للصحة العامة.

التوصية بتقديم لقاح Comirnaty من فايزر/ بايونتك BioNTech / Pfizer

يوجد الآن لقاحان تم اعتمادهما للاستخدام في الفئة العمرية 12-17 عامًا، لقاح BioNTech / Pfizer و لقاح Moderna Spikevax. التوصية الأولية لمعهد الصحة العامة تفيد بأنه ينبغي كقاعدة عامة تقديم لقاح Comirnaty للشباب في النرويج.

حصل لقاح Comirnaty على الموافقة منذ فترة طويلة مقارنة بغيره. تم حتى تاريخ 15 أغسطس تطعيم 12 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا بالجرعة الأولى في الولايات المتحدة وحدها و 9 ملايين بالجرعة الثانية. تمت الموافقة على لقاح موديرنا للشباب في نهاية يوليو 2021، وبالتالي هناك خبرات مكتسبة أقل في استخدامه. رغم ذلك يؤكد المعهد الوطني للصحة العامة على أن دراسات اللقاح تشير إلى أن اللقاحات متساوية من حيث الفعالية والأمان.

فاصل زمني من 8 إلى 12 أسبوعًا

سيتم إعطاء من تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عامًا جرعتين من اللقاح، مثل البالغين. من المقرر أن يكون الفاصل الزمني من 8 إلى 12 أسبوعًا بين الجرعتين الأولى والثانية. هناك سببان لذلك.

- السبب الأهم هو أنه لا تزال المعرفة محدودة حول الآثار الجانبية النادرة والخطيرة لالتهاب العضلة القلبية بعد التطعيم بلقاحات mRNA. تم الإبلاغ عن التهاب القلب بشكل أساسي بعد الجرعة الثانية. قبل أن نعطي الشباب في النرويج جرعة ثانية من اللقاح، نريد المزيد من المعرفة حول مخاطر ومسار المرض نتيجة الآثار الجانبية لالتهاب القلب. سنحصل على هذه المعرفة في الأشهر القادمة بعد قيام العديد من البلدان بتلقيح هذه الفئة العمرية. تراقب وكالة الأدوية النرويجية عن كثب الآثار الجانبية للقاح حسبما قال الوزير هوي.

- السبب الثاني هو أن الجرعة الأولى توفر حصانة جيدة ضد المرض الخطير ودخول المستشفى، كما أن الشباب بشكل عام يستجيبون بشكل جيد للغاية للقاحات. أظهرت الدراسات الحديثة أن الفاصل الزمني الطويل يمكن أن يوفر حصانة أفضل من الفاصل القصير، وهو أمر معروف أيضًا بالنسبة للقاحات الأخرى.

إذا تلقينا معرفة أو معلومات جديدة، يمكن تقصير الفاصل الزمني.

يمكن للشباب اتخاذ القرار بشأن التطعيم بأنفسهم

يكون الأشخاص مؤهلين قانونياً فيما يخص الشؤون الصحية عندما يبلغون 16 عامًا. لذلك يمكن للشباب الذين بلغوا سن 16 أن يقرروا بأنفسهم ما إذا كانوا يريدون التطعيم. إذا كان عمرهم أقل من 16 عامًا، فيجب على الأوصياء قانونياً (عادةً كلا الوالدين) الموافقة على التطعيم. سوف يتم أخذ رأي الشباب الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا بعين الاعتبار إلى حد كبير.